

“灿鸿”过后 这些补救措施要做好

台风“灿鸿”过后,我县水利、农业、林业等部门纷纷组织专家到受灾区现场指导灾后自救工作,以尽量减少损失。现摘录部分作物和畜禽的技术要点,供农民朋友参考。

水稻

- 1.受涝田块,要疏通沟渠,确保排灌畅通,及早排除积水。但避免一次性排尽田水,要保留田间水层 3cm 左右,防止遇高温晴热天气,高强度的叶面蒸发导致水稻生理失水。
- 2.受淹田块,要尽可能冲洗叶片泥浆,及时施肥。稻田肥料流失较多,植株生活力下降,退水后可根据稻苗长势适当补施肥料。对连作晚稻稻田排水后每亩立即追施尿素 5~8kg,加快恢复生长,促进分蘖。对单季晚稻稻田每亩追施尿素 5~6kg。对淹水深、时间长田块,台风后,先用每亩 0.1kg 磷酸二氢钾加 1kg 尿素进行叶面喷施,增强抗性;待排水露田后再适量追施化肥。
- 3.及时喷药,防治病虫害。台风过后,水稻特别容易暴发白叶枯病、细条病等病害,要注意进行防治。目前也正是防治纵卷叶螟和稻虱、纹枯病、稻曲病的关键时期,应不失时机抓好用药预防工作。

蔬菜

- 1.清沟排水。尽快采取有效措施及时开沟、清沟,排除田间积水,尽量减少蔬菜受淹时间,特别是瓜类蔬菜。
- 2.灾后抢救。及时采收已熟蔬菜瓜果,受水淹和积水重的菜田要加快抢救,适时上市,降低损失。
- 3.扶苗育苗。对倒伏和粘泥带砂的蔬菜植株先进行根部培土扶苗,及时摘除残枝叶,后用清水洗去泥污,促其尽快恢复生长。
4. 大棚防护。对大棚内蔬菜瓜果应及时开棚通风透气,以降低棚内湿度。又由于雨后天气马上转晴,阳光照射强烈,气温迅速上升,应及时覆盖遮阳网,做好遮阳防晒工作。
- 5.抢栽抢种。对采收结束或受雨水影响成灾的菜地,及时翻耕晾晒土壤,为后茬生产准备。选择雨后晴天适时播种育苗,抢播补种秋茼蒿、四季豆、花菜以及速生叶菜类等品种。
- 6.病虫害防治。灾后蔬菜容易发生叶菜类软腐病、瓜类疫病、白粉病、霜霉病、茄果类早疫病、叶霉病、灰霉病等病害,应选用高效低毒低残留农药对症下药。同时要注意防治斜纹夜蛾、甜菜夜蛾、小菜蛾等害虫。
- 7.加强管理。及时中耕除草,增加土壤的透气性,天气转晴后可视植株长势适当追肥,追肥一般以速效肥为好,适当增施磷钾肥,薄肥勤施,以及时补充养分,增强植株抗病能力,促进植株稳健生长。

果园

- 1.开沟排水。对水淹园地,要开沟疏渠,迅速排除园内积水,降低地下水位,加速表土干燥。对植株枝叶上的泥浆要及时用水清洗,挂在植株上的杂物要及时清除,淹水时间较长的植株,要剪除部分枝叶。
- 2.扶正树体。对被洪水冲倒的树要尽快扶正树体,并设支架支撑固定,对外露的根系要重新埋入土中,搞好培土覆盖。对伤根严重的树,要疏枝剪叶,减少叶片蒸发,防止死亡。树枝已经断裂的,要及时剪除。
- 3.适时松土。水淹后园地土壤板结,容易引起根系缺氧,待园地表土基本干燥时,及时进行松土。
- 4.根外追肥。树体受涝后根系受损,吸收肥水的能力较弱,不宜立即根施肥料,可选用 0.1~0.2% 的磷酸二氢钾、0.3% 尿素,以及叶面肥等进行根外追肥。每隔 5 天左右一次,连喷 2~3 次。待树势恢复后,再土施腐熟的人畜粪尿、饼肥或尿素,促发新根。

- 5.适度修剪。为减少受涝树枝叶水分蒸发和树体养分消耗,应进行适度修剪。修剪量根据受害程度确定,受害重的树除进行重剪外,还应摘去部分或全部果实。

- 6.病虫害防治。柑桔应注意急性炭疽病、溃疡病、黑点病、以及锈壁虱、红蜘蛛的发生;梨应注意黑星病、梨锈病、轮纹病的发生;桃应注意褐腐病和炭疽病的发生;杨梅应注意褐斑病、赤衣病的发生;枇杷应注意斑点病、灰斑病、角斑病、污叶病以及黄毛虫的发生;葡萄应注意黑痘病的爆发。这些病虫一旦发生,要及时对受淹园地进行一次全面防治,应选用对口农药,如 65% 代森锰锌、70% 甲基托布津、40% 多菌灵等进行防治。

畜禽

- 1.全面开展消毒。对畜禽饲养场所、动物及其产品交易市场、屠宰场、畜产品加工场地等要进行卫生清理,排除积水,在清扫后进行一次彻底的全面消毒、灭源工作。特别是规模饲养场户要用动物防疫部门分发的消毒药进行彻底消毒,消毒池内的消毒药要每天更换一次。散养户可用 10%~20% 的石灰水或 20%~30% 热草木灰水进行消毒。
- 2.保持环境卫生。对饲养场所进行彻底清扫和全面消毒,保持栏舍卫生,注意通风换气,及时排出栏舍、饲料储存场所内的不良气体。发现死亡畜禽一定要按规定做好无害化处理,严禁食用,以防中毒(深埋处理:一般坑深 2 米以上,在底层洒上石灰,尸体入坑后,洒上石灰或消毒药,再复以厚土。有条件的地方可以采用焚烧处理)。
- 3.加强饲养管理。要及时修复、加固被台风毁坏的栏舍,注意饮水卫生,提高饲料的营养成份配比,适当增加维生素、蛋白、能量,禁止饲喂变质饲料。防止肠道等传染病发生,可适量添加抗生素,提高营养水平,加强饲养管理,增强抵抗力,减少经济损失。
- 4.做好防疫工作。对未在免疫保护期内的畜禽立即进行免疫预防。同时,严禁非本场内的其它动物及其产品进入场内,防止疫病的传入与发生。
5. 防止饲料中毒。饲料饲喂前必须进行仔细的检查,防止用霉变的饲料饲喂畜禽。
- 6.加强检疫工作。要加强灾后畜禽及其产品的检疫工作,避免病、死畜禽流向市场,以保障人民身体健康,减少畜禽疫病的发生与传播。
- 7.加强疫情监测。要加强禽流感、五号病、猪瘟、新城疫、鸭瘟、禽出败等动物疫情的监测,及时准确掌握疫情动态,准备相应的疫苗等应急物资。要特别做好一类传染病、人畜共患病等动物疫病的监测工作,一旦发现疫情,要立即报告。

林木

- 1.及时排水。林木苗圃受到洪涝灾害后,应尽快进行抢救,以减少损失。首先要及时疏通沟渠,排除积水和淤泥杂物,整理苗圃地,平整苗床,做到明水直流,暗水直落。
- 2.扶苗洗苗。水退后,要及时扶正苗木,洗净苗木上的淤泥杂物,增加光合效能,待苗木恢复生机后再进行松土、除草,以促进苗木根系的生长发育。这是抢救苗木的基本措施,必须切实做好。
- 3.及时施肥。待苗圃地稍微干燥后,即可追施有机肥料和施磷钾肥,也可施草木灰,防止苗木烂根。过几天后,可喷施少量植物生长促进剂,以促进苗木根系吸收能力,加速苗木健康成长,提高抗病虫能力。
- 4.防病灭菌。被水淹的苗木都要进行一次防病灭菌工作。可在清理苗圃地淤泥杂物的基础上,对苗圃地全面喷施 0.5%~1% 的波尔多液进行消毒。若发现猝倒病,应及时用托布津或多菌灵防治。

(县农业局 林业局提供)

